Pour **toutes les plaies** que vous rencontrez **au quotidien**

NOUVEAU AQUACEL™ Foam

Pansement hydrocellulaire pour les plaies chroniques et aiguës

ConvaTec

NOUVEAU AQUACEL™ Foam

Pansement hydrocellulaire pour les plaies chroniques et aiguës



Avantages du pansement AQUACEL™ Foam

- **Facile à poser, tient en place sur tout type de reliefs** [1]
  Sa structure très souple et douce permet de se conformer au corps



Forme multisite posée sur un pli axillaire

- **Réduit la douleur pendant le port et au retrait** [1]
  La combinaison unique gel de CMC/silicone permet de repositionner ou d'enlever le pansement sans traumatiser le lit de la plaie et la peau périlésionnelle [1]

- **Préserve la peau périlésionnelle et les berges de la plaie** [2-5]
  Son absorption verticale unique évite le débordement des exsudats sur la peau saine



Sans AQUACEL™ Foam

- **Protège les tissus néoformés**
  A l'inverse de la majorité des pansements hydrocellulaires siliconés, AQUACEL™ Foam a du silicone uniquement là où c'est nécessaire : sur les bords du pansement, pas au contact direct du lit de la plaie. AQUACEL™ Foam protège ainsi les tissus néoformés


Silicone uniquement sur les bords
Enduction de silicone en contact avec le lit de la plaie
AQUACEL™ Foam
Autres pansements hydrocellulaires siliconés

Sur quels types de plaies utiliser AQUACEL™ Foam ?

Photo : F. Jullien IDE (Nice)

Dermabrasion

Photo : C. Espinosa IDE (Toulouse)

Abrasion de peau d'une personne âgée (râpage sur crépis)



Photo : C. Espinosa IDE (Toulouse)

Plaie post abcès axiliaire

Photo : E. Bremond IDE (Grasse)

Brûlure du second degré

Cas clinique

Patient âgé de 25 ans présentant une dermabrasion au niveau de l'épaule gauche suite à une chute en moto

Etat de la plaie à J0 :

- Plaie douloureuse type brûlure
- Plaie superficielle peu exsudative avec une peau périlésionnelle saine

Evolution de la plaie :

- Plaie améliorée avec une surface diminuée
- Peau périlésionnelle protégée



Application d'AQUACEL™ Foam adhésif
Changement tous les 2 jours

Photo : P. Vasseur IDE (Marseille)

Mode d'emploi et références

Placer le pansement sur la plaie en faisant coincider le centre de la zone absorbante avec le centre de la plaie.

Version adhésive

Version non adhésive

Pansement sacrum

Pansement Multisite/Talon

Références AQUACEL™ Foam

Remboursement LPPR Sécurité Sociale*						
Version adhésive silicone						
Code ICC	Taille du pansement	Taille de la zone absorbante	Boîtage	Code LPPR	ACL 13	ACL 7
420804	8 cm x 8 cm	5,5 cm x 5,5 cm	10	1350653	3401053414672	5341467
420620	12,5 cm x 12,5 cm	8,5 cm x 8,5 cm	16	1387188	3401051633105	5163310
420621	17,5 cm x 17,5 cm	13,5 cm x 13,5 cm	10	1327370	3401051633273	5163327
420653	21 cm x 21 cm	17x17 cm	10	1354355	3401051633334	5163333
Forme adhésive talon/multisite						
Code ICC	Taille du pansement	Taille de la zone absorbante	Boîtage	Code LPPR	ACL 13	ACL 7
420655	19,8 cm x 14 cm	14 cm x 8,7 cm	10	1375050	3401051633044	5163304
Forme adhésive sacrum						
420656	20 cm x 16,9 cm	11,4 cm x 13,5 cm	10	1347875	3401051632962	5163296
Version non-adhésive						
Code ICC	Taille du pansement		Boîtage	Code LPPR	ACL 13	ACL 7
420186	12,5 cm x 12,5 cm		16	1387188	3401051633624	5163362
420188	17,5 cm x 17,5 cm		10	1327370	3401051633563	5163356
420663	15 cm x 20 cm		10	1327370	3401051633792	5163379
420662	20 cm x 20 cm		10	1354355	3401051633853	5163385

NOUVELLE TAILLE

* AQUACEL® foam est un dispositif médical de classe IIb (CE0086), fabriqué par ConvaTec. Il est destiné à la prise en charge des plaies chroniques et aiguës. AQUACEL® foam est remboursable par la Sécurité Sociale au titre 1er, chapitre 3, section 1, sous-section 1, paragraphe 2 de la L.P.P.R dans la prise en charge des plaies aiguës sans distinction de phase, plaies chroniques en phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Lire attentivement la notice d'instruction du produit avant utilisation.

Les pansements de type hydrocolloïde, hydrocellulaire, alginate, hydrogel, en fibres de CMC, à base d'acide hyaluronique, interface, à l'argent et vaselinés ne sont pas destinés à être associés entre eux sur une même plaie sauf précision contraire de la nomenclature.
L'association entre deux ou plus de ces pansements pour une même plaie n'est pas prise en charge à l'exception des cas prévus par la nomenclature.

1 Healthy Volunteer Study Report, Protocol CW-0207-11-A736. Data on File, ConvaTec Inc
2. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PF. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (Aquacel) and alginate dressing. Biomaterials. 2003 ; 24(5) : 883-890.
3. Robinson BJ. The use of a hydrofiber dressing in wound management. J Wound Care. 2000 ; 9(1) : 32-34.2001 ; 22(9) : 903-912. 1
4. Waring MJ, Parsons D. Physico-chemical characterisation of carboxymethylated spun cellulose fi bres. Biomaterials.
5. In vitro testing of AQUACEL TM Foam and competitive dressing lateral spread WHRI3525 MS065 Rev I. data on file, ConvaTec Inc.

ConvaTec

Avril 2013 ®/™ sont des marques déposées par ConvaTec Inc. © ConvaTec Inc.